


IMPFKALENDER

Stand: August 2010

Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)

Empfohlenes Impfalter	GEBURT	Alter in Monaten					Alter in Jahren			
		2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-17	ab 18	ab 60
Impfung gegen										
Wundstarrkrampf (Tetanus)		1.	2.	3.	4.		A	A		A ^{b)}
Diphtherie		1.	2.	3.	4.		A	A		A ^{b)}
Keuchhusten (Pertussis)		1.	2.	3.	4.		A	A		A ^{c)}
Haemophilus influenzae Typ b (Hib)		1.	2. ^{a)}	3.	4.					
Kinderlähmung (Poliomyelitis)		1.	2. ^{a)}	3.	4.			A		
Hepatitis B		1.	2. ^{a)}	3.	4.			G		
Pneumokokken		1.	2.	3.	4.					S
Meningokokken										
Masern, Mumps, Röteln (MMR)						1. ^{d)}				
Windpocken (Varizellen)						1.	2.			
Humane Papillomviren (HPV)									e)	
Influenza									f)	



A Auffrischimpfung S Standardimpfung

G Grundimmunisierung für alle Jugendlichen, die bisher nicht geimpft wurden bzw. Komplettierung eines noch unvollständigen Impfschutzes.

a) Bei Einzelimpfstoffen und Impfstoffen ohne Pertussisanteil kann diese Dosis entfallen.

b) Auffrischimpfung alle 10 Jahre c) Die nächste fällige Tetanus-Diphtherie-(Td)-Impfung soll einmalig mit einem Td-Pertussis bzw. Td-Pertussis-Poliomyelitis-Impfstoff erfolgen.

d) Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat

e) Impfung von Jugendlichen ohne Windpockenerkrankung oder -impfung

f) Für alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren g) Jährlich mit aktuellem Impfstoff

Ziel muss es sein, möglichst frühzeitig einen vollständigen Impfschutz zu erreichen. Abweichungen von den angegebenen Terminen sind möglich und unter Umständen notwendig.

